



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ପଶୁମ ମାଳ ଅଂଚଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , (ଓଡ଼ିଶା
କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ)
ଭବାନୀପାଟଣା



ପତ୍ର ସଂ - ୧୧

ସପ୍ତାହ- ୦୭

ତାରିଖ- ୧୩.୦୨.୨୦୧୮

ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ - ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ - ୧୪.୦୨.୨୦୧୮ ରୁ ୧୮.୦୨.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

ଆସନ୍ତା ୧୮.୦୨.୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରୁ ତା.୧୪.୦୨.୨୦୧୮ ଦିନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ର କେତେକ ସ୍ଥାନ ରେ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣା ରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସମୟରେ ତା.୧୫.୦୨.୨୦୧୮ ରୁ ୧୮.୦୨.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଅଜ୍ଞାତ ରୁ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ପବନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୦୩-୦୦୪ କି.ମି. ବେଗ ରେ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ଏହି ସମୟ ରେ ଦିନ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨-୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨-୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୪୫-୭୧ % ଓ ୧୩-୨୫ % ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି.

ଡାକୁଅ ଧାନ:

- ତାଲିଘେରା ରେ ଧାନ ତଳି ତିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା କୁ ଦେଖି ଡାକୁଅ ଧାନ ରେ ଜଳସେଚନ ର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ.
- ଡାକୁଅ ଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ଚେର ଲାଗିବାରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ଡାକୁଅ ଧାନ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ଘଷା ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକରକୁ ସହଜ କିସମ ରେ ୨୫ କିଲୋ ମୁରିଆ ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ରେ ୩୫ କିଲୋ ମୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
- ଡାକୁଅ ଧାନ ରେ ଘଷା ନିଅନ୍ତୁଣା ପାଇଁ ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର କୁ ୨,୪-ଡି ethyl ester ୮୦୦ମିଲି ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ଆଖୁ:

- ଆଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକଳ ହେବା (୫୦-୫୨ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଖୁ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ.
- ଆଖୁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡିଗଲେ ଓ ବୃକ୍ଷ ମିଟର ୧୮-୨୦ ସୁତନାକ ହେଲେ ଅମଳ କରି ଶୀଘ୍ର ତିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ ଅମଳ କରନ୍ତୁ.
- ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି କୁ ଗଭୀର ଚାଷ କରନ୍ତୁ.
- ସୁସ୍ଥ ଓ ତିନି ଅଖୁଆ ଆଖୁ ବିହନ କିସମ ନୀଳମାଧବ, ସାବିତ୍ରୀ, Co ୭୫୦୮, Co ୭୭୦୪, Co ୭୨୧୭୫, Co ୭୪୦, Co ୭୨୧୯, CoJ ୮୨୦୧, Co ୯୭୫, Co ୭୭୦ 6, Co ୮୪୦୧, Co ୭୨୧୭୫ ଇତିଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
- ଆଖୁ ବିହନ କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୧ ଗ୍ରାମ ବାଭିଞ୍ଚିନ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ.
- ଶେଷ ଓଡ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକରକୁ ୧୦ଟନ ଗୋବର ଖାତା ଓ ୧୩୦ କିଲୋ ଏସ.ଏସ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ଗଜା ହେବ ସମୟରେ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତର ରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ.

- ମୁଲି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସଫା କରି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଗ ହେବ ପରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ. ଏହାପରେ ଏକରକୁ ୫୦କିଲୋ ମୁରିଆ ଓ ୫୦ କିଲୋ ଡି. ଏ.ପି. ଓ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ୧୫ ଦିନ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରାଣ କରନ୍ତୁ.

ମୁଗ ଓ ବିରି

- ମୁଗ ଓ ବିରି ୬-୮ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ପାଇଁଶିଆ ରୋଗ ର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ଗ୍ରାମ ୮୦% sulphur କିମ୍ବା ୩୦୦ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡଜୀମ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
- ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ସହେବି ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଓପାଡି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୪୦୦ଗ୍ରାମ ଏସିଫେଟ ୭୫% ଏସ.ପି. କିମ୍ବା ୫୦ମିଲି ଇମିଡ଼ାକ୍ଲପ୍ରିଡ଼ ୨୫% W. G. କୁ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ପିଆଜ:

- ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ରୁଆ ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫- ୭ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ରୁଆ ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ୭ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଏକରକୁ ୨୩ କିଲୋ ମୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ.

ଟମାଟୋ:

- ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ଟମାଟୋ ୧୦-୧୨ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ଟମାଟୋ ର ପତ୍ର ମୋଟା ରୋଗ ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ଧଳା ମାଛି ନିଅନ୍ତଣ କରନ୍ତୁ.ଏହାର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୪୦୦ଗ୍ରାମ acephate ୭୫% SP କିମ୍ବା ୫୦ମିଲି imidacloprid ୧୭.୮% SL କିମ୍ବା ୬୦ଗ୍ରାମ thiomethaxome ୨୫% WG କୁ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ଫୁଲ କୋବି ଓ ବନ୍ଧା କୋବି:

- ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲ କୋବି ୧୧-୧୨ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ଠିକାରିଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର କୁ ୫୦ ମିଲି flubendiamide ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା