



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 03-02-2023

ଗଞ୍ଜମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-02-03 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-02-04	2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07	2023-02-08
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	29.0	29.0	29.0	29.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	45	54	57	57	58
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	18	16	18	21	18
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6.5	6.3	6.1	7.3	7.7
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	288	252	251	252	158
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	2	1	1	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସକ୍ତା ୫ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଗ ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 15-16 ରୁ 29-30 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର 16-21% ରୁ 45-58% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବହାର କରି ଖରାଟିଆ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏକପରେ ନିର୍ଭର କରି 7-8 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆସକ୍ତା ୫ଦିନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଗସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଗସ୍ୟ	ଗସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୂଗ	ମୂଗ ଓ ବିରି ରେ ପତ୍ର ଖାଇବା କୀଟ ଏବଂ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆ କୀଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକର ପିଛା 2ml profenofos 50% EC କିମ୍ବା 2 ml quinalphos 25% EC କିମ୍ବା 1 ml dichlorvos 76% EC ର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଧାନ ରୋପିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏକର ପିଛା 35 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP, 30 କିଲୋଗ୍ରାମ MOP ଏବଂ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଲୁକା ମାଟି ପାଇଁ ଶେଷ କଦଳୀ ସମୟରେ ଏକର ପିଛା 35 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP, 15 କିଲୋଗ୍ରାମ MOP ଏବଂ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜିଙ୍କ ଅଭାବୀ ମାଟିରେ ପ୍ରତି ଡିନି ବର୍ଷରେ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ (21%) @ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । 25-30 ଦିନ ପୁରୁଣା ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ 20 x15 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ପାଇଁ ପାହାଡ ପ୍ରତି 2-3 ଟି ବିହନ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଆମ୍ବ	ଆମ୍ବ ରପତ୍ତ ତିଆଁ ଯୋକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫସଫାମିଡନ୍ @2.5 ମି.ଲି. ଫୁଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, କୀଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କରି ମାରିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିକର @ 8-10 / ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୀଟ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନ-ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM @ 600-ml / ଏକର 200-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ପ୍ରତି ୩-୪ ମାସ ରେ ଗୋବର ପରୀକ୍ଷା କରି ଓ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କୃମି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ